






Лабораторія листкової діагностики HBK «Квадрат» Схеми відбору зразків для тканинної діагностики рослин


Зернові колосові

	
До фази кінця кушення: зрізати рослину повністю на рівні кількох сантиметрів від ґрунту (необхідно 50–70 рослин)	Початок колосіння: зрізати прапорцевий і підпрапорцевий листок (необхідно 50–70 рослин)

Кукурудза


		
Фаза 4–6 листків: зрізати рослину повністю на рівні кількох сантиметрів від ґрунту (необхідно 25–30 рослин)	Фаза 5–12 листків: зрізати два верхніх повністю сформованих листки в місці прикріплення до стебла (необхідно 20–25 рослин)	Після викидання волоті: зрізати листок напроти качана в місці прикріплення до стебла (необхідно 25–35 рослин)

Цукрові буряки




Усі фази розвитку:
зрізати 30–40 листових пластинок з різних рослин
(повністю сформовані, але не старі листки)

Соняшник





Фаза 2–4 пар листків:
зрізати рослину повністю на рівні
кількох сантиметрів від ґрунту
(необхідно 25–30 рослин)





Фаза 4–7 пар листків:
зрізати третій–четвертий зверху повністю
сформований листок
(необхідно 25–30 рослин)

Бобові (соя)

	
Фаза 1–3 трійчастих листків: зрізати рослину повністю на рівні кількох сантиметрів від ґрунту (необхідно 35–40 рослин)	Фаза бутонізації — початок цвітіння: зрізати перший–другий зверху повністю сформований трійчастий листок (необхідно 35–40 рослин)

Ріпак

	
До фази розетки: зрізати рослину повністю на рівні кількох сантиметрів від ґрунту (необхідно 25–30 рослин)	Від фази розетки до цвітіння: відібрати п'ятий зверху листок без черешка з 35–45 різних рослин